

定期予防接種スケジュール

*標準的な接種スケジュールの一例となります。具体的な接種スケジュールについては、医師に相談しましょう！



○予診票等は出生届を提出された次月初旬に発送いたします。

○定期予防接種対象者には、個別に案内いたします。

○転入者の方は接種歴をご連絡ください。(未接種分の予診票発行、接種案内等の参考にいたします。)*詳しくはホームページをご覧ください。

ワクチン		種類	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小学校就学前年度	7歳	8歳	9歳	11歳	小学校6年生	13歳	14歳	高校1年生相当	20歳未満	
ロタウイルス	ロタリックス (2回接種)	経口生	①	②		生後6週以上24週未満								遅くとも生後14週6日までには接種を開始 27日以上あけて2回又は3回接種														
	ロタテック (3回接種)		①	②	③			生後6週以上24週未満																				
B型肝炎		不活化	①	②				③						初回：27日以上あけて2回 追加：1回目から139日以上あけて1回														
ヒブ ※1		不活化	①	②	③	生後2か月から7か月までに開始 初回：27日以上あけて3回						④	3回目終了後7か月以上13カ月までの間に接種															
小児用肺炎球菌 ※1		不活化	①	②	③	生後2か月から7か月までに開始 初回：27日以上あけて3回					④	12か月から15か月までの間に3回目終了後から60日以上あけて接種																
五種混合 (DPT-IPV-Hib) 四種混合 (DPT-IPV)		不活化	①	②	③	生後2か月から7か月までに開始 初回：20日以上あけて3回					④	3回目終了後から6か月以上あけて接種																
BCG		注射生				①	1歳に至るまでに接種 生後5か月から8か月の間																					
麻しん風しん混合 (MR)		注射生					生後12か月から24か月に至るまでに接種						①						②	小学校就学前の1年間 (4月1日～翌年3月31日までの間)							特例対象者 (H7.4.2～H19.4.1生) は不足回数を20歳までに接種可能です！	
水痘 (水ぼうそう)		注射生											①	②	1回目：生後2か月から15か月の間 2回目：1回目終了後6か月から12か月までの間													
日本脳炎		不活化						3歳から4歳に至るまでの間 初回 (2回)：6日以上28日までの間をあける							①	②	③				④	9歳から10歳に至るまでに接種						
二種混合 (DT)		不活化																										
子宮頸がん予防 (HPV) 対象者：女子	シカトド (9価)	不活化	12歳となる日の属する年度初日から16歳となる日の属する年度末日までの間にある女子 (小学6年生の4月1日から高校1年生に相当する年の3月31日まで)										初回接種が15歳未満の場合 → 6か月あけて2回接種 初回接種が15歳以上の場合 → 2か月あけて2回目、1回目から6か月あけて3回目を接種															
	ガーゲシル (4価)		2か月あけて2回接種 → 1回目から6か月あけて3回目を接種													①	②	③										
	サルブリックス (2価)		1か月あけて2回接種 → 1回目から6か月あけて3回目を接種													①	②	③										

定期接種の可能な期間



標準的な接種期間

青文字…対象年齢

ピンク文字…標準的接種期間・間隔

○他の種類のワクチンを接種する場合の接種間隔○

※複数回接種する必要がある同一ワクチンの接種間隔は、それぞれのワクチンの規定に従って下さい。



五島市国保健康政策課
☎0959-88-9166