2. 消　毒　表

対　　象	通　　常	下痢・嘔吐発生時
床・廊下等	水拭き清掃後、適時、消毒剤で拭きあげる。	次亜塩素酸ナトリウム液(0.1%)で拭きあげ、10分後水拭きする。 ※便、嘔吐物が付着した場合は、次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)で処理する。 (次ページ参照) ※使い捨て手袋・マスク・エプロンなどを着用。使用後は消毒に使用したモップなども次亜塩素酸ナトリウム液(0.1%)につけて消毒する。
棚・机・椅子等		
手洗い場 (蛇口・洗面台等)		
トイレ周り (便座・ドアノブ等)		
おもちゃ類	洗えるものは、水で洗い日光消毒。 洗えないものは、消毒剤での拭きあげや日光消毒。	洗えるものは、次亜塩素酸ナトリウム液(0.1%)に浸け置き消毒後、日光消毒。 洗えないものは、次亜塩素酸ナトリウム液(0.1%)で拭きあげ、日光消毒。
寝具類	洗濯し日光消毒。	便、嘔吐物が付着した場合は、次亜塩素酸ナトリウム液(0.1%)に10分間浸すか、85℃で1分以上の熱湯消毒を行い、他のものと分けて最後に洗濯する。 ※運搬や保管に使用する容器も消毒する。
手　指	流水と石けんで洗い、ペーパータオルまたは個別タオルで拭く。	１つの作業ごとに流水と石けんで洗い、消毒剤で消毒し、ペーパータオルで拭く。